

Antidiabético	Dosis terapéutica (mg/día)	Mecanismo de acción	Contraindicaciones
Biguanidas • Metformina	850 – 2250	Disminuye la resistencia a la insulina.	En pacientes con TFG <30 ml/min o exacerbación de trastornos gastrointestinales.
Inhibidores de SGLT-2: • Dapagliflozina • Empagliflozina	10 25	Inhiben la reabsorción de glucosa a nivel tubular renal.	En pacientes que presenten infecciones genitourinarias recurrentes o depleción de volumen o con antecedente de cetoacidosis.
Inhibidores de la DPP4: • Sitagliptina • Linagliptina	100 5	Inhiben a la dipeptidilpeptidasa tipo 4 que degrada al GLP1 (péptido semejante al glucagón tipo 1).	Sitagliptina: en pacientes con tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45 ml/min la dosis es de 50 mg. Entre ≥15 y <30 ml/min, en diálisis peritoneal o hemodiálisis la dosis es de 25 mg.
Análogos de GLP1: • Semaglutida oral	3 7 14	Potencian la secreción de insulina, inducida por glucosa e inducen saciedad.	En pacientes con historia familiar o personal de cáncer medular de tiroides y neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en pacientes con sospecha o confirmación de pancreatitis y en diabetes tipo 1. No se recomienda en pacientes en diálisis.
Sulfonilureas: • Glibenclamida • Glimepirida	2.5 a 15 1 a 4	Aumentan la secreción de insulina.	En pacientes con edad > 65 años o con índice de masa corporal >30 kg/m ² o con tasa del filtrado glomerular <45ml/min.